

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Marburg
Direktor: Prof. Dr. H. Hamelmann

**Die Refraktur langer Röhrenknochen als Komplikation
verschiedener Methoden der Knochenbruchbehandlung -
demonstriert am Krankengut der Chirurgischen
Universitätsklinik Marburg/Lahn**

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung des Doktorgrades der Zahnheilkunde
des Fachbereichs Humanmedizin
der
Philipps-Universität Marburg/Lahn

vorgelegt von
Alexander Schipke
aus Glatz

Marburg/Lahn 1973



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Marburg

Direktor: Prof. Dr. H. Hamelmann

**Die Refraktur langer Röhrenknochen als Komplikation
verschiedener Methoden der Knochenbruchbehandlung -
demonstriert am Krankengut der Chirurgischen
Universitätsklinik Marburg/Lahn**

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung des Doktorgrades der Zahnheilkunde

des Fachbereichs Humanmedizin

der

Philipps-Universität Marburg/Lahn

vorgelegt von

Alexander Schipke

aus Glatz

Marburg/Lahn 1973



Angenommen vom Fachbereich Humanmedizin der
Philipps-Universität Marburg am 18. 9. 1973

gedruckt mit Genehmigung des Fachbereiches

Dekan: Prof. Dr.med. H. Oepen

Referent: Prof. Dr.med. K. Hupe

Correferent: Prof. Dr.med.dent. H. Schnell

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
1. EINLEITUNG	1
2. ZUR DEFINITION DER REFRAKTUR	2
2.1 Der Bedeutungswandel des Begriffes "Refraktur"	2
2.2 Kritische Würdigung des behandelten Schrifttums	4
2.3 Die "Sekundärfraktur"	5
2.4 Neue Einteilung der Refrakturen	6
3. MATERIAL	7
4. ERGEBNISSE	7
4.1 Vorbetrachtung zu der Auswertung der Refrakturen	7
4.2 Übersicht über das gesamte Krankengut	8
4.2.1 Die nach konservativer Behandlung aufgetretenen Sekundärfrakturen	8
4.2.2 Die nach operativer Behandlung auf- getretenen Sekundärfrakturen	9
4.2.2.1 Sekundärfrakturen als Folge ver- schiedener operativer Behandlungs- methoden	9
4.2.2.2 Sekundärfrakturen nach Marknagelungen	9
4.2.2.3 Sekundärfrakturen nach Druck- plattenosteosynthese	10
4.2.2.4 Sekundärfrakturen nach Drahtcerclage	10
4.2.2.5 Sekundärfrakturen nach Versorgung mit Pins	10

4.3 Auswertung der einzelnen Sekundärfrakturen	10
4.3.1 Der Kallusbruch	11
4.3.2 Die Ermüdungsfraktur	12
4.3.3 Der Neutralisationsbruch	13
4.3.4 Der Versprödungsbruch	14
4.3.5 Der Dystrophiebruch	14
5. DISKUSSION DER EINZELNEN SEKUNDÄRFRAKTUREN	15
5.1 Der Kallusbruch	15
5.2 Der Ermüdungsbruch	19
5.3 Der Neutralisationsbruch	22
5.4 Der Versprödungsbruch	30
5.5 Der Dystrophiebruch	35
5.6 Schlußfolgerungen	37
6. ZUSAMMENFASSUNG	40
7. LITERATURVERZEICHNIS	42

1. E I N L E I T U N G

Die Refraktur langer Röhrenknochen war früher Thema weniger, aber ausführlicher Arbeiten (BÜTTNER 20, FRINTA 28, KAPEL 42, PERITZ 74, SAUPE 86, STRAUSS und MANDEL 97, TROELL 98). Heute wird sie jedoch nur beiläufig in Behandlungsstatistiken erwähnt, ohne daß auf ihre tiefere Ursache näher eingegangen wird. Man könnte daraus den voreiligen Schluß ziehen, daß mit Anwendung neuer Osteosynthesemethoden, wie der Marknagelung nach KÜNTSCHER und der Druckplattenosteosynthese der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (A und O) die Refraktur an Bedeutung verloren hat. Diese ausreichend stabilisierenden Methoden haben zweifellos einige Vorteile gegenüber der konservativen Behandlung: so verhindern sie z.B. weitgehend Immobilisationsschäden an Muskeln und Gelenken, weil die verletzte Extremität nur kurzzeitig ruhiggestellt werden muß und der Patient deshalb frühzeitig mit Bewegungsübungen beginnen kann. Andererseits ergeben sich daraus aber auch Nachteile, denn durch Verwendung eines metallischen Fremdkörpers bei der Frakturheilung verändert sich der Knochen im Bereich des Implantates strukturell so, daß dadurch aus verschiedenen Gründen das Auftreten einer Refraktur begünstigt werden kann. Vielleicht ist dieser Variationsreichtum mit ein Grund dafür, daß die Refraktur im neueren traumatologischen Schrifttum kaum Beachtung findet.

Das Ziel dieser Arbeit soll der Versuch sein, anhand des Krankengutes der Chirurgischen Universitätsklinik Marburg/Lahn diejenigen Hauptursachen herauszuarbeiten, die zu einer Refraktur führen können, zum anderen sollen die Möglichkeiten zu ihrer Verhütung kurz diskutiert werden.

Es erscheint jedoch sinnvoll, zuvor eine neue Einteilung der Refrakturen vorzunehmen, da die übliche Klassifizierung als nicht befriedigend angesehen werden muß, denn sie läßt die, erst aufgrund moderner Osteosyntheseverfahren aufgetretenen biomechanischen Probleme unberücksichtigt und wird damit nicht mehr den jetzigen Anschauungen hinsichtlich der Pathogenese der Refrakturen gerecht.

2. Z U R D E F I N I T I O N D E R R E F R A K T U R

2.1 Der Bedeutungswandel des Begriffes "Refraktur"

STRAUSS und MANDEL (97) machten 1933 zwischen Rezidiv- und Refraktur noch keinen Unterschied und definierten sie als "Frakturen, die an der Stelle eines früheren Bruches in einem pathologisch nicht veränderten Knochen erfolgen". Ebenso treffen sie noch keine klare Abgrenzung gegenüber der Lokalisation des Zweitbruches, denn sie schreiben: "Im weiteren Sinne erfaßt die Bezeichnung den erneuten Bruch eines Knochens. Im engeren Sinne findet die Bezeichnung Anwendung auf einen Bruch an der Stelle eines früheren Bruches."

1941 veröffentlichte SAUPE (86) eine Arbeit unter dem Titel "Rezidivbrüche und Refrakturen", in der er versucht, die beiden Begriffe klarer gegeneinander abzugrenzen. Refraktur bedeutet für ihn das Wiederbrechen des Knochens an derselben Stelle. Somit sind diese Refrakturen Kallusbrüche oder "Knochenneubildungsbrüche". Unter Rezidivbruch versteht er das Brechen an einer zweiten Stelle des Knochens, da es sich hierbei nicht um eine Refraktur, sondern um ein Rezidiv, d.h. ein "Wiederauftreten derselben Krankheit, nämlich des Bruches irgendwo an demselben Gliedmaßenabschnitt handelt."

Dabei klammert SAUPE (86) alle pathologischen Frakturen aus, so z.B. alle Refrakturen, die aufgrund von Osteomyelitiden auftreten.

Diese weiterhin noch unbefriedigende Einteilung versuchte BÜTTNER (20) im Jahre 1948 durch Ergänzungen zu vervollkommen. Er kritisierte zuerst den von SAUPE (86) geprägten Begriff "Rezidivbruch". Seiner Meinung nach handelt es sich bei einem Bruch an einer anderen Stelle desselben Knochens um keinen Rückfall, da der neue Bruch ohne jede innere Beziehung zum alten Bruch steht, sondern um einen Neubruch; somit kommt er zu folgender Einteilung:

1. Refraktur im eigentlichen Sinne - Kallusfraktur oder Knochenneubildungsbruch. Der zweite Knochenbruch erfolgt in der früheren Bruchebene, die nur durch die Heilungsvorgänge abgewandelt ist.
2. Neubruch.
3. Grenzzonenbruch. BÜTTNER (20) macht die Entdeckung, daß nicht selten der Zweitbruch in unmittelbarer Nähe der früheren Knochennarbe verläuft und macht dafür Unterschiede im Festigkeitsgrad der Knochennarbe und des angrenzenden Knochens verantwortlich.
4. Brüche im dystrophischen Knochen. Diese Brüche können auftreten, wenn sich während der Frakturheilung ein Knochenschwund stärkeren Grades einstellt und zu einem erneuten Bruch, auch fernab vom ersten, führt. Diese Zweitbrüche sind das Bindeglied zu den eigentlichen Spontanfrakturen.

2.2 Kritische Würdigung des behandelten Schrifttums

Zur Kritik dieser drei Arbeiten wäre zu sagen, daß die Einteilung von STRAUSS und MANDEL (97) schon deshalb nicht befriedigen kann, weil ein erheblicher Unterschied darin besteht, ob ein Knochen an derselben oder an einer anderen Stelle "refrakturiert".

SAUPE (86) wiederum klammert alle pathologischen Frakturen aus. Jedoch sollten auch die Refrakturen, die aufgrund einer bakteriellen Entzündung der Erstfraktur entstehen, ebenfalls in Refrakturstatistiken aufgenommen werden, da ja letztlich jede Fraktur eine Entzündung darstellt (KÜNTSCHER, 51), das eine Mal durch Gewebszerfall abakteriell, das andere Mal durch Bakterientoxine nach einer Infektion.

BÜTTNER (20) beachtet mit seiner Einteilung nur solche Refrakturen, denen morphologische Veränderungen, bedingt durch den Erstbruch, zugrunde liegen, also z.B. Refrakturen aufgrund ungenügender Belastbarkeit des neugebildeten Kallus oder Refrakturen durch ungleichmäßige periostale Kallusbildung durch in Achsenabknickung verheilte Frakturen oder Refrakturen durch Knochendystrophie. Jedoch gilt heute als erwiesen, daß auch allein durch Veränderung des Spannungszustandes an einem völlig normalen Röhrenknochen durch Versprödung (LEITZ, 61) eine Refraktur auftreten kann. Zum anderen sollte man Neubrüche, die BÜTTNER (20) unter Punkt 2 seiner Einteilung aufführt, überhaupt nicht in die Gruppe der Refrakturen einordnen, da sie mit dem Erstbruch - auch im weitesten Sinne - nichts zu tun haben.

2.3 Die "Sekundärfraktur"

Der Begriff "Refraktur" sollte - wie im deutschen Sprachraum schon lange üblich - nur auf solche Brüche angewendet werden, die mit dem Erstbruch topographisch übereinstimmen und mit ihm mittelbar zusammenhängen. Diese Refraktur kann, muß aber nicht, eine Kallusfraktur sein, um so weniger, als heute durch Anwendung moderner Osteosyntheseverfahren die kallusfreie angiogene Knochenbruchheilung bei Schaftbrüchen wesentlich häufiger vorkommt (SEGMÜLLER und ALLGÖWER, 92). Für diese Fälle wäre der von BÜTTNER (20) geprägte Begriff "Knochenneubildungsbruch" passender, jedoch kann man - nach WILLENEGGER et al. (107) - im allgemeinen auch bei der primären Knochenbruchheilung neben der corticogenen (=angiogenen) Heilung eine mehr oder weniger geringe periostale und auch endostale Knochenapposition beobachten, so daß die Bezeichnung "Kallusbruch" auch für diese Art der Heilung weiterhin seine Berechtigung hat.

Der somit nicht mehr verfügbare Überbegriff "Refraktur" sollte durch "Sekundärfraktur" ersetzt werden (KÖBLER und SCHIPKE, 48), weil unseres Erachtens damit besser als mit der deutschen Bezeichnung "Zweitbruch" zum Ausdruck gebracht wird, daß diese erneute Fraktur mehr oder weniger auf einen früheren Bruch zurückzuführen ist, außerdem könnte man bei der deutschen Bezeichnung leicht an eine Mehrfachverletzung denken.

Von der Lokalisation her ergibt sich somit folgende Einteilung der Sekundärfrakturen:

1. Refrakturen - hervorgerufen durch erneuten Bruch in der ehemaligen Frakturzone.

2. Grenzzonenbrüche und Plattenendzonenbrüche - hierbei bricht der Knochen mehr oder weniger weit entfernt von der ehemaligen Bruchstelle; dieser Sekundärbruch steht aber ebenso wie die Refraktur in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erstbruch.

Diese Einteilung nach der Lokalisation kann jedoch noch nicht ganz befriedigen, denn sie sagt nichts über die Entstehungsursache der Sekundärfrakturen aus. Zwar müssen wir gerade bei den stabilen Osteosynthesemethoden - wie schon angedeutet wurde - mehrere Faktoren berücksichtigen, die ein Refrakturieren des Knochens begünstigen (z.B. Spongiosierung der Corticalis, Kerbwirkung, Elastizitätsverlust), jedoch sollte es in den meisten Fällen durch sorgfältige Nachuntersuchung und durch den Röntgenbefund möglich sein, eine Hauptursache zu finden, die für die Sekundärfrakturen verantwortlich ist.

2.4 Neue Einteilung der Refrakturen

Bei Analysierung der Sekundärfrakturen der Chirurgischen Universitätsklinik Marburg/Lahn ergab sich, daß sie nur auf wenige Faktoren zurückzuführen sind.

Sekundärfrakturen infolge

1. plötzliche Überbelastung eines störungsfrei unter Kallusbildung heilenden Knochens (= Kallusbruch = Knochenneubildungsbruch);
2. einer mehr oder weniger chronischen Überbelastung (= Ermüdungsbruch);
3. funktionelle Anpassung des Knochens an das Osteosynthesematerial (= Neutralisationsbruch);
4. Veränderung des Spannungszustandes des Knochens (= Versprödungsbruch) und
5. gestörte Ernährung (= Dystrophiebruch).

3. M A T E R I A L

Aus den Krankenblättern der Chirurgischen Universitätsklinik Marburg/Lahn wurden sämtliche Patienten mit Schaftfrakturen der langen Röhrenknochen herausgesucht, die in den Jahren 1961 - 1970 stationär aufgenommen worden waren. Folgende Daten aus den Krankengeschichten wurden auf extra vorbereiteten Bögen festgehalten: Name und Geburtsdatum des Patienten, Unfallereignis, Fraktur, Begleitverletzungen oder -erkrankungen, Erstversorgung außerhalb, Versorgung in der Chirurgischen Universitätsklinik Marburg/Lahn, Krankheitsverlauf und Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Traten Komplikationen bei der Knochenbruchheilung auf, so wurden zusätzlich die betreffenden Röntgenaufnahmen in der Röntgenabteilung eingesehen.

4. E R G E B N I S S E

4.1 Vorbetrachtung zu der Auswertung der Refrakturen

Folgende Schwierigkeiten traten bei der exakten Erfassung der Refrakturen auf:

1. Die Diagnose "Sekundärfraktur" fiel in einigen Fällen nicht ganz leicht. Zwar kann eine Refraktur definitionsgemäß nur dann auftreten, wenn der Erstbruch abgeheilt ist, aber gerade bei den stabilisierenden Osteosynthesemaßnahmen ist es bei Fällen "verzögerter Bruchheilung" manchmal nicht leicht, zwischen Pseudarthrose und Refraktur klar zu unterscheiden.
2. In einigen Fällen wurden die Patienten nach der Erstversorgung in ein anderes Krankenhaus verlegt

und entgingen somit unserer weiteren Beobachtung; auch muß bei einem kleinen Teil der Patienten angenommen werden, daß sie nach aufgetretenen Komplikationen den Arzt gewechselt haben.

3. Bei einem geringen Teil der Patienten war bei Abschluß der Untersuchungen das Osteosynthesematerial noch nicht entfernt worden.

3.1 Übersicht über das gesamte Krankengut

In dem bearbeiteten Zeitraum (von 1961 - 1970) wurden 1126 Patienten mit Schaftbrüchen stationär aufgenommen. Davon wurden 558 operativ und 568 konservativ versorgt. Wir beobachteten dabei insgesamt 43 Sekundärfrakturen, die sich wie folgt auf die beiden Patientengruppen verteilen:

4.2.1 TABELLE 1 : Die bei konservativer Behandlung von
----- Schaftbrüchen (1961 - 1970) aufgetre-
tenen Sekundärfrakturen

Lokalisation der Fraktur	Anzahl der Patienten	Anzahl der Refrakturen
Oberarm	60	2
Unterarm	86	4
Oberschenkel	83	3
Unterschenkel	339	8
Insgesamt	568	17

4.2.2 TABELLE 2 : Die bei operativer Behandlung von Schaft-
----- brüchen (1961 - 1970) aufgetretenen
Sekundärfrakturen

Lokalisation der Fraktur	Anzahl der Patienten	Anzahl der Refrakturen
Oberarm	62	4
Unterarm	82	4
Oberschenkel	197	5
Unterschenkel	217	13
Insgesamt	558	26

4.2.2.1 Sekundärfrakturen als Folge verschiedener operativer

Behandlungsmethoden

Unterteilt man die bei der operativen Behandlung auf-
getretenen Sekundärfrakturen nach den einzelnen Be-
handlungsmethoden, so ergibt sich folgendes Bild:

4.2.2.2 TABELLE 3 : Die in unserer Klinik durchgeführten Mark-
----- nagelungen (1961 - 1970) und die dabei auf-
getretenen Sekundärfrakturen

Lokalisation der Fraktur	1961	62	63	64	65	66	67	68	69	70	Ges.	Refrak- tur
Oberarm	--	6	3	1	6	2	--	5	2	--	25	1
Unterarm	--	--	--	--	3	--	--	1	--	--	4	-
Oberschenkel	16	17	19	22	16	13	25	18	13	28	187	2
Unterschenkel	4	7	16	17	13	21	16	17	12	15	138	5
Insgesamt	20	30	38	40	38	36	41	41	27	43	354	8

4.2.2.3 TABELLE 4 : In unserer Klinik werden Druckplattenosteosynthesen erst seit 1963 durchgeführt, deshalb enthält die folgende Tabelle die von 1963 - 1970 durchgeführten Druckplattenosteosynthesen und die dabei aufgetretenen Sekundärfrakturen.

Lokalisation der Fraktur	1963	64	65	66	67	68	69	70	Ges.	Refrak- tur
Oberarm	--	--	1	--	--	2	4	--	7	2
Unterarm	8	9	14	4	6	6	7	9	63	2
Oberschenkel	--	1	--	--	--	--	9	3	13	3
Unterschenkel	9	14	2	3	--	--	17	8	53	5
Insgesamt	17	24	17	7	6	8	37	20	136	12

4.2.2.4 Sekundärfrakturen nach Drahtcerclage

Die Drahtcerclage wurde in dem bearbeiteten Zeitraum (1961 - 1970) als alleinige stabilisierende Maßnahme in 15 Fällen angewandt. Diese Osteosynthesemaßnahme führte in 4 Fällen zu Sekundärfrakturen.

4.2.2.5 Sekundärfrakturen nach Versorgung mit Pins

Die beiden restlichen Sekundärfrakturen traten bei einem Ober- und Unterarm auf, die mit einem Rush-pin versorgt worden waren (Gesamtzahl der mit einem Rush-pin versorgten Schaftfrakturen = 41)

4.3 Auswertung der einzelnen Sekundärfrakturen

Analysieren wir die Sekundärfrakturen nach der oben erarbeiteten Einteilung, so ergibt sich folgendes Bild:

Art der Sekundär- fraktur	Kallus- bruch	Ermüd.- bruch	Neutr.- bruch	Verspr.- bruch	Dystr.- bruch
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Anzahl der Fälle	14	10	5	5	9
---------------------	----	----	---	---	---

Tabelle 5 : Einteilung der 43 Sekundärfrakturen

4.3.1 Der Kallusbruch

Er tritt in unserem Krankengut bei 14 Patienten auf und ist somit am häufigsten vertreten.

Die altersmäßige Verteilung dieser Sekundärfrakturen ist folgende:

Patienten bis zu 16 Jahren erlitten	7 Refrakturen
Patienten bis zu 21 Jahren erlitten	5 Refrakturen
Ältere Patienten	erlitten 2 Refrakturen

Tabelle 6 : Altersmäßige Verteilung der Kallusbrüche

Bei den Patienten bis zu 16 Jahren, die alle konservativ behandelt wurden, waren folgende Extremitäten gebrochen:

Oberarm	--
Unterarm	4 Refrakturen
Oberschenkel	2 Refrakturen
Unterschenkel	1 Refraktur

Tabelle 7 : Lokalisation der Refrakturen bei den Patienten bis zu 16 Jahren

6 Patienten waren Jungen, ein Patient ein Mädchen.
Bei den Patienten bis zu 21 Jahren wurden ebenfalls alle bis auf einen Unterarm, der mit einem Rush-pin

versorgt wurde, konservativ behandelt. Es ergibt sich folgende Verteilung:

Oberarm	2 Refrakturen
Unterarm	1 Refraktur
Oberschenkel	1 Refraktur
Unterschenkel	1 Refraktur

Tabelle 8 : Lokalisation der Refraktur bei den Patienten bis zu 21 Jahren

Hierbei waren alle Patienten männlichen Geschlechts.

Diese 11 konservativ behandelten Kallusbrüche entsprechen 65 % der Sekundärfrakturen nach konservativer Behandlung.

Bei den beiden älteren Patienten, die einen Kallusbruch erlitten, wurden ein Unterschenkel mit einem Marknagel und ein Oberarm mit einem Rush-pin versorgt.

4.3.2 Die Ermüdungsfraktur

Ermüdungsfrakturen wurden in unserem Krankengut 7 mal durch Metaller müdung und 3 mal durch Ermüdung des Knochengewebes hervorgerufen.

Die Metaller müdungsbrüche verteilen sich dabei wie folgt auf die einzelnen Implantate:

1. Marknagel Oberarm, Nagelbruch nach 5 Jahren
 2. Marknagel Oberschenkel, Nagelbruch nach 3 Monaten
 3. Druckplatte Oberarm, Plattenbruch nach 1 Monat
 4. Druckplatte Oberarm, Plattenbruch nach 4 Monaten
 5. Druckplatte Oberschenkel, Plattenbruch nach 3 Monaten
 6. Druckplatte Oberschenkel, Plattenbruch nach 2 1/2 Mon.
 7. Druckplatte Oberschenkel, Plattenbruch nach 2 1/4 Mon.
-

Tabelle 9 : Ermüdungsbrüche von Metallimplantaten

Wir verzeichnen in unserem Krankengut - wie Tabelle 9 zeigt - 3 Oberschenkelfrakturen durch Bruch der Druckplatten. Im bearbeiteten Zeitraum wurden an unserer Klinik 13 Oberschenkel mit einer Druckplatte versorgt, somit entspricht das einer Refrakturnhäufigkeit von 23,1 %.

Die 3 Refrakturen durch Ermüdung des Knochengewebes sahen wir alle am Unterschenkel. 2 davon nach Ausbildung einer Tibiapseudarthrose mit Refraktur der Fibula, die dritte nach Marknagelung.

4.3.3 Der Neutralisationsbruch

Unsere 5 Neutralisationsbrüche traten 4 mal nach Druckplattenosteosynthese und 1 mal nach Marknagelung auf.

Es ergibt sich folgende Aufstellung:

1. Druckplattenosteosynthese einer Radiusfraktur, nach 11 Monaten Entfernung der Platte, 4 Tage später Refraktur
2. Druckplattenosteosynthese einer Ulnafraktur, nach 12 Monaten Plattenentfernung, nach weiteren 3 1/2 Monaten Refraktur
3. Druckplattenosteosynthese einer Unterschenkelfraktur, nach 8 Monaten Entfernung der Platte, nach 3 1/2 Monaten Refraktur
4. Druckplattenosteosynthese einer Unterschenkelfraktur, nach 2 Jahren Entfernung der Platte, nach 6 Monaten Refraktur
5. Marknagelung einer Unterschenkelfraktur, nach 17 Monaten Entfernung des Nagels, nach 6 Monaten Refraktur

Tabelle 10 : Neutralisationsbrüche nach den verschiedenen Osteosynthesemaßnahmen

4.3.4 Der Versprödungsbruch

Sekundärfrakturen infolge Versprödung beobachteten wir in unserem Krankengut in 5 Fällen, 2 mal nach konservativer Behandlung, 2 mal nach Drahtumschlingung und 1 mal nach Marknagelung.

In 4 Fällen war der Unterschenkel und in einem Fall der Oberschenkel betroffen.

4.3.5 Der Dystrophiebruch

Refrakturen infolge ungenügender Ernährung des Knochens beobachteten wir in 9 Fällen. 4 mal nach konservativer Behandlung und 5 mal nach operativer Behandlung.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Lokalisation der Fraktur	Art der Behandlung	Refraktur- ursache
1. Unterschenkel	Druckplatte	Infektion
2. Unterschenkel	Druckplatte	Infektion
3. Unterschenkel	Marknagel	Sperrwirkung der Fibula und Infektion
4. Oberschenkel	Marknagel und Cerclage	ungenügende Kallus- bildung
5. Unterschenkel	Cerclage	ungenügende Kallus- bildung
6. Unterschenkel	kons.Behandlung	Osteomyelitis
7. Unterschenkel	kons.Behandlung	ungenügende Kallus- bildung
8. Unterschenkel	kons.Behandlung	ungenügende Kallus- bildung
9. Unterschenkel	kons.Behandlung	ungenügende Kallus- bildung

Tabelle 11 : Dystrophierefrakturen

5. DISKUSSION DER EINZELNEN SEKUNDÄRFRAKTUREN

5.1 Der Kallusbruch

Er tritt in unserem Krankengut in der Mehrzahl der Fälle bei Kindern und Jugendlichen auf. Das deckt sich mit den in der Literatur beschriebenen Fällen von Kallusfrakturen (BREMER 14, BÜTTNER 20, FRINTA 28, KAPEL 42, PERITZ 74, SAUPE 86, SEYFFARTH 96, STRAUSS und MANDEL 97). Die meisten dieser Autoren sehen im Vorderarm die bevorzugte Lokalisation für diese Sekundärfrakturen. Auch das entspricht in etwa unserer Erfahrung, wobei in unserem Krankengut das Bild insoweit verfälscht wird, daß ein Teil dieser Refrakturpatienten nicht stationär aufgenommen wurde und somit nicht ausgewertet werden konnte.

Über die Ursache dieser Kallusfrakturen gehen die Meinungen der einzelnen Autoren jedoch auseinander. FRINTA (28) unterteilte sein Krankengut in zwei Gruppen. In der ersten befanden sich solche Refrakturen, die durchschnittlich 10 Tage nach der Gipsabnahme auftraten. Als Ursache nahm er bei einer durchschnittlichen Ruhigstellung von 4 - 6 Wochen bei Vorderarmschaftbrüchen eine zu kurze Ruhigstellung an und bezeichnete diese Refrakturen als "Brüche des unreifen Kallus". In der zweiten Gruppe waren solche Refrakturen, die frühestens nach durchschnittlich 76 Tagen auftraten. FRINTA (28) bezeichnete sie als Brüche des "geschwächten Kallus" und sah in ihnen die Folge einer Heilungsstörung durch Verzögerung der Kallusreifung und Verkalkung. Dies wird seiner Meinung nach hervorgerufen durch eine Säuerung der Bruchumgebung, die

durch Sauerstoffmangel ausgelöst wird, da es infolge von Reflexreizung zu einem Gefäßspasmus kommt.

Diese Ursache kann zweifellos einmal zu einer Refraktur führen, sie stellt jedoch in der Regel eine große Ausnahme dar, und es wäre zu erwägen, ob es sich hierbei nicht um Dystrophiebrüche handelt.

PERITZ (74) wiederum nahm Ernährungsbedingungen (Kriegs- und Nachkriegsjahre) und Vitaminmangel durch die Wintermonate als Ursache der Refrakturen seines Krankengutes an. Mag das auch früher eine der Refrakturursachen gewesen sein, so darf man doch nicht verkennen, daß gerade in den Wintermonaten die Frakturhäufigkeit ansteigt und somit ebenfalls eine Erklärung für die häufigeren Refrakturen zu dieser Jahreszeit wäre.

Wir müssen uns vielmehr der Meinung BÜTTNERS (20), KAPELS (42), SAUPES (86) und SLYFFARTHS (96) anschließen, die eine ungenügende Festigkeit des Kallus als Refrakturursache annehmen.

Die Knochenbrüche von Kindern werden auch heute meist konservativ behandelt. EHALT (25) gibt als Heildauer einer Vorderarmfraktur bei Kindern bis zum Alter von 10 Jahren 5 - 6 Wochen und bis zum Alter von 16 Jahren 8 - 10 Wochen an. Nach dieser Zeit ist die Fraktur in den meisten Fällen zwar klinisch fest und physiologischen Ansprüchen gewachsen, jedoch ist mit dem Auftreten und der Verfestigung des Kallus die Knochenbruchheilung noch längst nicht abgeschlossen. Das läßt sich folgendermaßen erklären: Bei jedem Bruch eines Röhrenknochens sterben die Osteozyten im Bereich der Fraktur in einer variablen Breite ab, weil ihre Ernährung durch die Zerreißung vieler Blutgefäße mangelhaft geworden ist.

Dieser nekrotische Knochen muß im Laufe der Knochenreparation vom Kallus aus schleichend ersetzt werden. Erst wenn dieser Prozeß abgeschlossen ist, kann die Bruchheilung als beendet betrachtet werden (GEISER 29). Bei einem Erwachsenen dürfte das nicht vor einem Jahr der Fall sein; bei einem Kind wird der Bruch zwar schneller heilen, aber mit Abnahme des Gipsverbandes ist der Knochen noch nicht in der Lage, starke Belastungen aufzunehmen. Zwei Beispiele aus unserem Krankengut mögen das zeigen:

Patient H.S., 13 J.: Fraktur des rechten Vorderarmes, konservative Behandlung auswärts. Der Bruch war gut ausgeheilt; nach 3 1/2 Monaten Refraktur durch Sturz auf beide Arme beim Spielen.

Patientin U.R., 16 J.: Durch Autounfall Trümmerfraktur des linken Oberschenkels. 13 Wochen Drahtextension. Bruch war klinisch fest; nach 5 Wochen Refraktur. Die Patientin war über einen Teppich gestolpert und hingefallen.

In beiden Fällen führte ein erneutes starkes Trauma zur Refraktur, das durch seine Intensität vielleicht auch an einem gesunden Knochen eine Fraktur hätte hervorrufen können.

Wir sehen bei einem Erwachsenen die Kallusfraktur viel seltener, weil bei ihm ungewollte Überbelastungen durch Sturz etc. nicht so häufig vorkommen. Trotzdem kann auch hier eine Kallusfraktur nicht ausgeschlossen werden, wie folgender Fall zeigt:

Patient G.L., 24 J.: Komplizierte Querfraktur des rechten Unterschenkels im distalen Drittel. Am Unfalltag geschlossene Marknagelung, die zu einer befriedigenden Osteosynthese führte. Nach 23 Monaten Entfernung des Marknagels. Der Bruchspalt war im Röntgenbild nicht mehr zu sehen; nach weiteren 3 Monaten Refraktur durch einen Arbeitsunfall; ein Baumstamm schlug gegen das rechte Bein des Patienten.

Auch hier führte ein erneutes starkes Trauma zur Refraktur. Der ehemalige Frakturspalt war offensichtlich trotz der langen Ruhigstellung noch nicht vollständig belastungsoptimal durchstrukturiert, um nach Entfernung des Nagels einer so starken Gewalteinwirkung standzuhalten. Bei diesem Fall fällt die Abgrenzung gegenüber dem Neutralisationsbruch, der eine funktionelle Anpassung des Knochens an das Osteosynthesematerial zur Voraussetzung hat, nicht ganz leicht. Jedoch führen dort in der Regel minimale Traumen zur Refraktur, zum anderen gestattet der Marknagel meistens schon während der Frakturheilung dem Knochen, sich belastungsorientiert durchzustrukturieren, weil er durch seinen Sitz im Markrohr die Corticalis nicht wesentlich entlastet und sich außerdem nach einiger Zeit lockert, so daß es hier nicht so leicht zu einer funktionellen Anpassung des Knochens an den Marknagel kommt. Trotzdem zeigt dieser Fall, daß der Knochen im Bereich der ehemaligen Frakturzone seine alte Festigkeit nur langsam zurückgewinnt und deshalb nach Entfernung des Implantates nicht übermäßig belastet werden darf.

Die Kallusfraktur von Kindern und Jugendlichen ist eine relativ häufige Komplikation bei der Knochenbruchheilung. In unserem Krankengut sind 2/3 aller Sekundärfrakturen

nach konservativer Behandlung darauf zurückzuführen, jedoch sollte das nicht dazu verleiten, eine Fraktur über Monate hinaus ruhigzustellen, um nur unter allen Umständen eine Refraktur zu vermeiden. Vielmehr sollte auch hier die Dauer der Ruhigstellung nach dem Röntgenbefund erfolgen, wobei man aber die Möglichkeit einer ungewollten Überbelastung in den Therapieplan mit einbeziehen sollte.

5.2 Der Ermüdungsbruch

In unserem Krankengut beobachten wir die Ermüdungsrefraktur häufig durch Bruch der Metallimplantate, wobei wir jedoch annehmen dürfen, daß dabei kaum Materialfehler eine Rolle spielen, denn heute werden zur Herstellung von Platten und Marknägeln fast ausschließlich hochwertige V4A- oder Vitalliumstähle verwendet. Auch Korrosionsbrüche durch Benutzung verschiedener sich berührender Metallegierungen haben nach Einführung eines einheitlichen Instrumentariums bei Marknagelungen und Druckplattenosteosynthese kaum noch klinische Bedeutung.

Vielmehr müssen wir die Ursache dieser Refrakturen in einer chronischen Überbeanspruchung des Metallimplantates sehen. Zu Beginn der Frakturheilung ist das Metall im wesentlichen der einzige Kraftträger, aber auch bei fortgeschrittener Heilung wird das Implantat die meisten Kräfte aufnehmen müssen, denn der neugebildete Kallus ist überhaupt noch nicht belastbar - wie KÜNTSCHER (51) an einem 3 Wochen alten Kallus zeigen konnte - sondern reißt schon bei sehr geringen Druck- und Zugbeanspruchungen ein; kommen zu diesem mehr oder weniger unvermeidlichen Beanspruchungen noch weitere, etwa eine zu frühe oder zu starke Belastung der Extremität, so wird das Metall auf die Dauer eine

Ermüdung seines Gefüges erfahren und brechen (BÜCKLE DE LA CAMP 19).

Dieser Vorgang ist elektrochemisch als Spannungskorrosion zu deuten; man versteht darunter die Zerstörung der passiven Oberflächenschicht der Metalle durch abnorme mechanische Beanspruchung, auch bei Verwendung technisch und biologisch einwandfreier Metalle (CONTZEN 22). Auf der Metalloberfläche bilden sich dabei Trübungen, Unregelmäßigkeiten und grubenartige Vertiefungen aus, die dann zu Verbiegung oder Bruch des Metalles führen können.

Aber auch nach Entfernung des Osteosynthesematerials oder nach konservativer Behandlung kann es zu Ermüdungsfrakturen kommen, wie folgende Fälle aus unserem Krankengut zeigen:

Patient W.R., 53 J.: Unterschenkelfraktur (Tibia distales Drittel, Fibula proximales Drittel), Kompressionsschraubenosteosynthese. Nach 8 Monaten Entfernung des Osteosynthesematerials, nach weiteren 3 Monaten erneute Aufnahme wegen beginnender Tibiapseudarthrose mit Fibularefraktur. Der Patient war mit dem Fuß umgeknickt.

Patient K.Z., 39 J.: Patient zog sich bei einem Verkehrsunfall eine komplizierte Unterschenkelfraktur rechts zu. Nach Wundheilung wurde eine Unterschenkelmarknagelung durchgeführt. Nach 11 Monaten erschien der Patient in unserer Klinik, weil er seit Wochen Schmerzen unterhalb des Kniegelenkes beim Gehen hatte. Der Lokalbefund zeigte, daß unterhalb des Kniegelenkes der Nagelkopf durchastbar war. Da das Röntgenbild eine noch nicht vollständige Konsolidierung der Fraktur

zeigte, wurde dem Patienten eine Umnagelung vorgeschlagen, die er jedoch ablehnte. Deshalb frühzeitige Entfernung des Nagels. Nach 3 Wochen verspürte der Patient zunehmend Schmerzen im Bein, schließlich konnte er nicht mehr auftreten. Der Röntgenbefund ergab eine Refraktur.

In beiden Fällen führte eine chronische Überbelastung des Knochens zu einer Refraktur, im ersten durch Ausbildung einer Tibiapseudarthrose, im zweiten durch zu frühe Belastung der Tibia.

Durch unphysiologische Beanspruchung des neugebildeten Knochengewebes über einen längeren Zeitraum ist es hier zu einem Umbau im Gewebe, zu einer "Zerrüttung" gekommen. Histologisch gesehen ordnen sich dabei die betroffenen Zellgruppen mit ihren Bindegewebsfasern in Richtung der einwirkenden Schubkräfte um. Dadurch hat der Knochen in diesem Bereich seine elastischen Eigenschaften verloren, denn dieser Umbau ist ein irreversibler Vorgang. Man spricht in der Festigkeitslehre von plastischer Verformung. Ebenso kommt es nun zu Mikroblutungen durch Zerreißung vieler kleiner Kapillaren (HAASE 37); die Folge ist eine ungenügende Ernährung des Knochenabschnittes. Durch weitere Belastung erfolgt dann der Bruch.

Die Verhütung dieser Sekundärfrakturen beruht einmal darin, eine zu frühe Belastung der verletzten Extremität zu vermeiden; dabei gilt grundsätzlich, daß Frakturen mit innerer Schienung früher belastbar sind, als solche durch Schrauben- oder Plattenosteosynthese (PELZL 73). Der Hauptgrund ist wohl darin zu sehen, daß bei der Marknagelung neben dem Nagel auch die Knochencorticalis Kräfte übertragen kann, während die

Druckplatte durch ihre Gerathe und ihren Sitz außen am Knochen weitgehend alle Kräfte aufnimmt und es hier bei durch Überbeanspruchung relativ leicht zum Bruch kommen kann. Deshalb beobachten wir in unserem Kranken- gut Nagelrische wesentlich seltener als Plattenrische; vornehmlich am Oberschenkel scheitern bei uns 1/4 aller Druckschraubensystemen zur Fixierung durch Bruch der Platte. Deshalb wird deshalb empfohlen, zwei Platten zu verwenden, jedoch nicht dadurch die gesamte Stabilität durch extreme Vorspannung und extreme morphologische Veränderung des Knochens erkauft. Auch sollten die Platten dann weitestmöglich entfernt werden, um dem Knochen genügend Zeit zum Umbau zu geben.

Auch das beste Material, die besten von Platten und die Verwendungs- in Günstiger Markung! können den Bruch des Metalls zur Folge haben. Nach Entfernung des Implantates soll das Bruch nicht allmählich erfolgt haben, weil sonst ein unvollständiges Knochengerüst - nämlich das Metall - verbleiben ist.

Auf die Beschaffenheit des Metalls sollte ebenfalls geachtet werden: FUCHS-WÄRTZ und SCHÖNEMANN (11) empfehlen, Verschleißungen des Metalloberfläche zu vermeiden, weil dadurch schon entstehen, die zu Spannungsrisissen führen und die Lebensdauerigkeit des Implantates herabsetzen. Ebenso empfehlen sie, Markungal gut zu polieren, um die Oberflächengüte zu erhöhen.

1.1 Der Neutralisationsbruch

Es ist dadurch gekennzeichnet, daß er die strukturelle Anpassung des Knochens an das Implantat zur Voraussetzung hat.

Die durch Verletzung, Trauma oder Infektion hervorgerufene Fraktur wirkt eine gewisse Zeit die Kräfte, die auf den Knochen einwirken, es neutralisiert somit den Frakturspalt. Was dadurch für die Knochenbruchheilung gewonnen ist, sei im folgenden Abschnitt kurz geschildert.

KROMPECHER (50) hat 1935 an embryonalen Rattenschädeln nachgewiesen, daß, wenn während der Ossifikation das Gewebe unter Zugspannung gehalten wird, Bindegewebe als Stützgewebe entsteht. Diesen Vorgang bezeichnete er als desmale Ossifikation. Bei Druckspannungen jedoch entsteht Knorpel (chondrale Ossifikation). Findet die Ossifikation aber in einer von Spannungen völlig freien (neutralen) Zone statt, dann entsteht kein intermediäres Stützgewebe, es erfolgt die primäre angiogene Ossifikation, d.h. die Osteoblasten, die die Blutgefäße begleiten, scheiden das Osteoid ab, das durch Einlagerung von Kalksalzen seine Härte gewinnt. Dadurch entsteht ein um das Blutgefäß in Lamellen angeordneter Knochen.

Dieser Vorgang ist auch am erwachsenen Knochen reproduzierbar, wie ALLOGBARK et al. (3), MÖLLER (62), SCHENK et al. (38), SACMELLER et al. (32) und WILLENEGGER et al. (16), beweisen konnten; dazu ist jedoch erforderlich, daß die Knochenneubildung in einem mechanisch neutralen Feld erfolgt. Nur hier vollzieht sich eine Corticalisregeneration aus den Havers'schen Kanälen und es entsteht ein direkt aus Osteonen aufgebauter, geordneter Knochen (BAGGETT 3), und wir bezeichnen den Vorgang als primäre Knochenbruchheilung.

Erfolgt die Knochenbruchheilung jedoch in mechanischen Spannungsfeldern, dann werden die von Osteoblasten umhüllten Gefäße durch Intermediärgewebe gegen die mechanischen Einflüsse abgeschirmt. Es kommt zur Ausbildung eines Fixationskallus und erst dann zur Bildung von lamellärem Knochen (sekundäre Knochenbruchheilung).

Es wird deutlich, daß es sich bei der primären und sekundären Knochenbruchheilung nicht um zwei verschiedene Arten der Heilung handelt, sondern daß die Unterschiede mehr im Quantitativen liegen, ist doch die Größe des Fixationskallus hauptsächlich abhängig von der Größe des Frakturspalt es und von der Unruhe im Frakturgebiet. Werden diese beiden Faktoren weitgehend ausgeschaltet, so brauchen sich die reparativen Vorgänge nur auf den Frakturspalt zu beschränken, was von der Ökonomie der Knochenbruchheilung als sehr sinnvoll erscheint. Andererseits ist die sofortige Ausbildung von hochwertigem Knochen nur dann nützlich, wenn damit auch eine baldige Belastbarkeit der verletzten Extremität verbunden ist; das ist aber nur dann zu erreichen, wenn die neugebildeten Osteone sofort belastungsorientiert angeordnet werden. Untersucht man daraufhin die beiden heute gebräuchlichsten operativen Verfahren, nämlich die Marknagelung und die Druckplattenosteosynthese, so ergeben sich in dieser Hinsicht wesentliche Unterschiede.

Bei der Druckplattenosteosynthese ist es nur in der plattennahen Corticalis möglich, die Fragmentenden ideal zu adaptieren, während in der plattenfernen Corticalis immer ein Spalt in den corticalen Fragmentenden bleiben wird. Deshalb ist - nach WILLENEGGER et al. (107) - mit zwei Heilungsmechanismen zu rechnen, der Kontakt- und Spaltheilung. Bei der Kontaktheilung erfolgt die Knochenregeneration über longitudinal gerichtete neue Osteone. Ihre Bildung wird eingeleitet durch Osteoklasten, die einen Resorptionskanal "ausbohren", der unmittelbar anschließend von Osteoblasten besiedelt und mit neuen Knochenlamellen ausgefüllt wird. Zum Eindringen von endostalen und periostalen Blutgefäßen kommt es hierbei nicht. Bei der Spaltheilung jedoch bringen diese Blutgefäße in den Spalt ein, da sich die corticalen Fragment-

ersten Schritt betreffen. Vor kommt es zur Durchdringung von Knochengewebe mittels der eingestrichenen Drahtseile. Erst im einen zweiten Schritt erfolgt die Durchdringung mit belastungsorientierter Knochen, die einerseits aus der Corticalis, andererseits aus dem Markknochen der Spalte selbst stammen. Somit ist dieser Knochenwachstum erst nach längerer Zeit belastungsorientiert.


Anders sind die Verhältnisse bei der Marknagelung. Der Marknagel als innerer Kraftträger gewährleistet ebenfalls eine gute Stabilisierung, jedoch schaltet er nicht, wie die Druckplatte, die Kraftübertragung über die Corticalis aus, so daß hier bei Belastung ein Druck auf die corticalen Fragmentenden ausgeübt wird und bei primärer Knochenbruchheilung eine belastungsorientierte Durchstrukturierung des Bruchspaltes mit Osteonen zu erwarten ist. Andererseits läßt der Marknagel Mikrobewegungen im Frakturspalt zu, so daß es zu einer mehr oder weniger großen Ausbildung einer Kallusspindel kommt (CALLGOWER 1), die aber keineswegs als minderwertig zu betrachten ist, da sie den Querschnitt im Frakturbereich vergrößert und somit zur Stabilisierung der Fraktur beiträgt, denn nach den Gesetzen der Mechanik nimmt die Biegefestigkeit eines Stabes ungefähr mit der dritten Potenz seines Durchmessers zu (KONTSCHER 53). Auch Einrisse in den Kallus sind nach einwandfrei durchgeführter Osteosynthese kaum zu befürchten, denn KÖBLER (46) konnte spannungsoptisch an einem Plexiglasmodell zeigen, daß trotz stärkster Biegebeanspruchung keine Kraftlinien im Bereich der Kallusspindel auftraten. Dieser Kallus fehlt aber weitgehend bei der Knochenbruchheilung nach einwandfrei durchgeführter Druckplattenosteosynthese. Deshalb wäre es durchaus denkbar, daß durch diese verminderte Stabilität schon geringe Biegekräfte zu Einrissen in der plattenfernen, vermindert belastungsfähigen Corticalis führen könnten. Diese Quer-

schon, die Verformung wurde dann zu einer weiteren Verformung des Frakturspaltes führen und bei weiterer Belastung eine Relativverschiebung eintreten.

Es lassen sich aber noch weitere Gründe für diese gebogene Verformung angeben, wenn Druckplattenversuche gemacht werden. Sie sind in einer adäquaten strukturellen Verankerung des Knochens durch das Interzellularmaterial zu suchen.

Der Knochenknochen ist von der Metaphyseverteilung her belastungsoptimal konstruiert. In seiner Bedeutung, wo die Druck- und Zugbeanspruchung am größten ist, haben wir in Form der Kompakta die größte Materialdichte. Der Knochen ist damit in der Lage bei wechselnder Beanspruchung von komprimierten Kräften auszuweichen, so dass einem Teile Knochen einer Drucklast wird jedoch eine einseitige Beanspruchung erzeugt und alle auf den Knochen wirkenden Kräfte werden in der Druckplatte gesammelt und auf das kleine Fragment übertragen, wo sie sich über die Schrauben in Knochen verteilen.


Zeichnung 1 zeigt diesen Vorgang:



Die Zeichnung zeigt den Verlauf der Kräfte, die durch die Schrauben in den Knochen übertragen werden. Die Kräfte fließen von der Druckplatte über die Schrauben in den Knochen und werden dort verteilt. Die Zeichnung ist eine schematische Darstellung des Kräfteflusses bei einer Belastung der Druckplatte.

Die Spannungslinien, die normalerweise bei Biegebeanspruchung in der Corticalis verlaufen, werden jetzt gleichsam außerhalb des Knochens - nämlich über die Druckplatte - übertragen; die Folge ist, daß die Corticalis in diesem Bereich funktionslos wird und atrophiert. Es kommt zu einer "Spongiosierung" dieses Corticalisabschnittes (ALLGOWER 2, MINIKER 83, SCHLAK und WILLENEGGER 88, 89, UEBLINGER und PULS 101). Die Schrauben aber, die bei Biegebeanspruchung mit in den Spannungslinienverlauf einbezogen werden, müssen fest im Knochen verankert werden, wir beobachten deshalb eine Sklerosierung der Spongiosa in Schraubennähe (WAGNER 104).

Diese strukturellen Veränderungen sind somit Folge der unphysiologischen Belastung des Knochens durch die Druckplatte. Sie können sich verhängnisvoll für die Belastungsfähigkeit des Knochens nach Entfernung der Platte auswirken, da sie plattenbezogen sind und nur bei liegender Platte sinnvoll erscheinen. Deshalb darf die Platte erst dann entfernt werden, wenn sie funktionslos geworden ist, d.h. wenn der Bruchhals mit belastungsorientiertem Lamellenknochen ausgefüllt ist, so daß der Knochen alle einwirkenden Kräfte aufnehmen kann. Wird sie jedoch früher entfernt, so besteht noch eine plattenbezogene Ausrichtung der Trajektorien, wie Zeichnung 2 zeigt:



Zeichnung 2: Schwächung der Konstruktion Knochen-Druckplatte infolge Plattenentfernung bei noch nicht ausgereifter knöcherner Konsolidierung des Bruchspaltes nach KÖPLER u. WIECHILL (33). Traktorienterter Verlauf bei der Druckplattenosteosynthese und seine biomechanische Auswirkung. Chirurg 42, 83 (1971).

Schon durch geringe Biegebeanspruchung kann es zu Einrissen in dem spongiosierten Teil der Corticalis und bei weiterer Belastung zur Refraktur kommen.

Deshalb genügen meist minimale Traumen, um einen Neutralisierungsbruch nach Druckplattenosteosynthese hervorzurufen, wie zwei Fälle aus unserem Krankengut zeigen:

Patient W.L., 56 J.: Patient kam mit der linken Hand in ein Förderband und zog sich dabei eine Ulnafraktur im proximalen Drittel mit einer Radiusköpfchenluxation zu (Monteggiafraktur). Druckplattenosteosynthese nach 10 Tagen. Nach 1 Jahr Metallentfernung; nach weiteren 3 1/2 Monaten Refraktur, als sich bei Patient auf dem Unterarm arbeitslos.

Patientin M.M., 44 J.: Durch Sturz von der Treppe Pat.-fraktur im mittleren Drittel. Wenige Tage später Druckplattenosteosynthese. Nach 11 Monaten Plattenentfernung, 4 Tage später Refraktur, als die Patientin eine Tür aufschließen wollte.

Auch HERR (70) hat auf dem Deutschen Orthopäde Kongress 1964 ähnliche Fälle erwähnt. Er berichtete dort von zwei Oberschenkelhafterbochen, die mit je zwei Druckplatten versorgt wurden. Nach einem Jahr Entfernung des Osteosynthesematerials mit dem Resultat, daß "beide Frakturen wenige Tage bzw. Wochen später spontan wieder auseinanderfielen".

Die Hauptursache dieser Refrakturen ist zweifellos in einer zu frühen Entfernung der Druckplatte zu suchen. Bei der Beurteilung der Frakturzone sind wir auf das Röntgenbild angewiesen, die klinische Untersuchung hat wegen der stabilen Osteosynthese wenig Aussagekraft. Das Röntgenbild wiederum zeigt nur das Verschwinden des Bruchspaltes an, sagt jedoch nichts über den Grad der Durchstrukturierung aus (SEGMÖLLER und ALLGÖWER 92). Berücksichtigt man noch, daß die Osteone zu ihrer vollständigen Ausreifung etwas mehr als ein Jahr benötigen (MÖLLER 68), so erscheint es sinnvoll, die Platte erst nach 1 1/2 bis 2 Jahren zu entfernen, um diese Sekundärfrakturen nach Möglichkeit zu verhindern. Auch sollte der Patient nach Entfernung der Platte die verletzte Extremität nur allmählich stärker belasten.

Zusammenfassend läßt sich das wesentlich häufigere Auftreten des Neutralisationsversagens nach Druckplattenosteosynthese als nach Marknagelung, das wir in unserem Krankengut beobachten, wie folgt deuten:

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

№	Имя	Возраст	Пол	Род занятий	Место рождения	Дата рождения	Дата смерти	Место захоронения
1	Иванов Иван Иванович	45	М	Рабочий	Москва	1910-01-15	1945-05-20	Восточное кладбище
2	Петров Петр Петрович	38	М	Солдат	Ленинград	1912-03-10	1945-06-15	Смоленское кладбище
3	Сидоров Сергей Сергеевич	42	М	Инженер	Новосибирск	1911-08-25	1945-07-10	Смоленское кладбище
4	Климов Алексей Алексеевич	35	М	Солдат	Волгоград	1913-02-05	1945-08-20	Смоленское кладбище
5	Васильев Василий Васильевич	40	М	Рабочий	Москва	1910-05-18	1945-09-10	Восточное кладбище
6	Михайлов Михаил Михайлович	33	М	Солдат	Ленинград	1914-01-22	1945-10-05	Смоленское кладбище
7	Попов Павел Павлович	48	М	Инженер	Новосибирск	1909-04-12	1945-11-20	Смоленское кладбище
8	Кузнецов Константин Константинович	36	М	Солдат	Волгоград	1913-07-08	1945-12-15	Смоленское кладбище
9	Лебедев Лев Леопольдович	41	М	Рабочий	Москва	1910-09-20	1946-01-10	Восточное кладбище
10	Зайцев Зинаид Зинаидовна	39	Ж	Сестра милосердия	Ленинград	1911-11-05	1946-02-25	Смоленское кладбище
11	Смирнов Степан Степанович	44	М	Инженер	Новосибирск	1910-12-18	1946-03-15	Смоленское кладбище
12	Морозов Морис Морисович	37	М	Солдат	Волгоград	1913-03-25	1946-04-10	Смоленское кладбище
13	Воробьев Владимир Владимирович	43	М	Рабочий	Москва	1910-06-10	1946-05-20	Восточное кладбище
14	Александров Александр Александрович	34	М	Солдат	Ленинград	1914-02-15	1946-06-10	Смоленское кладбище
15	Березин Борис Борисович	46	М	Инженер	Новосибирск	1909-03-28	1946-07-25	Смоленское кладбище
16	Виноградов Владимир Владимирович	32	М	Солдат	Волгоград	1914-04-12	1946-08-15	Смоленское кладбище
17	Григорьев Григорий Григорьевич	47	М	Рабочий	Москва	1909-05-25	1946-09-10	Восточное кладбище
18	Давыдов Давид Давидович	35	М	Солдат	Ленинград	1914-06-18	1946-10-05	Смоленское кладбище
19	Жуков Юрий Юрьевич	40	М	Инженер	Новосибирск	1910-07-10	1946-11-20	Смоленское кладбище
20	Зинин Зинаид Зинаидовна	38	Ж	Сестра милосердия	Ленинград	1911-08-22	1946-12-15	Смоленское кладбище

Man spricht in der Festigkeitslehre von Verprödung, wenn ein Körper seine elastischen Eigenschaften verliert. Dieser Vorgang läßt sich folgendermaßen veranschaulichen: Wird ein Körper in einer Richtung unter Druck gesetzt, so dehnt er sich senkrecht dazu aus. Im Winkel von 45° dazu entwickelt sich eine Schubspannung, weil die Kristalle des Körpers in eine für sie günstige Lage eintreten. Bei weiterer Lastzunahme tritt ein einachsiger Spannungszustand ein. Wird der Körper aber dem noch in einer anderen Richtung belastet, so entsteht ein zweiachsiger Spannungszustand. Er verliert dabei immer mehr seine Schubfähigkeit und damit seine Elastizität, die Folge ist eine Verprödung, da die Verringerung der Schubspannungen eine Formänderungsbegrenzung bedeutet. Diese Verprödung, die durch einen mehrachsigen Spannungszustand hervorgerufen wurde, ist keine Materialeigenschaft, sondern eine Folge der Belastung, und wir bezeichnen sie als Spannungsverprödung (LEITZ 61).

Vor allem nach Anbringen von Druckplatten und Kompressionschrauben ist die Gefahr einer Spannungsverprödung des Knochens gegeben. Durch eine von außen einwirkende Kraft, hervorgerufen durch Schlag, Stok oder Fall entwickelt sich ein zweiachsiger Spannungszustand, die Folge kann ein Brechen des verprödeten Knochens sein. Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse bei zwei Druckplatten, die rechtwinklig zueinander angebracht sind. Hier liegt von vornherein ein zweiachsiger Spannungszustand vor, der sich durch äußere Krafteinwirkung zu einem dreiachsigen entwickelt (LEITZ 66).

In unserem Krankengut beobachteten wir den Verprödungsbruch in 2 Fällen nach Drahtumwickelung. Hierbei kommt zu der Verprödung noch ein weiterer Faktor hinzu, die Kerbwirkung. Die Ausbildung einer spitzen Kerbe in der

Corticalis bewirkt neben einer Querschnittsverringering auch eine Spannungsversprödung im Kerbgrund bei Biegebeanspruchung. Durch wiederholte Belastung kann ein Bruch des Knochens die Folge sein, wie folgender Fall aus unserem Krankengut zeigt:

Patient K.F., 29 J.: Patient stürzte beim Spaziergang in eine Baugrube und zog sich dabei einen Oberschenkelspiralbruch zu. Operative Versorgung mit mehreren Drahtcerclagen. Nach 2 1/2 Monaten Belastung des Beines. Nach weiteren 9 Monaten Refraktur. Der Patient verspürte plötzlich Schmerzen im Bein beim Gehen; es handelte sich diesmal um einen Stückbruch im Bereich der liegenden Drahtcerclagen.

Nach Drahtumschlingung ist neben dem Versprödungsbruch auch der Dystrophiebruch in Erwägung zu ziehen, denn durch das feste Anbringen der Cerclagen wird die Durchblutung des Knochens sicherlich gestört (DENCKER 23, OLSSON 71), andererseits liegen im vorliegenden Fall 11 1/2 Monate zwischen operativer Versorgung und Sekundärfraktur, und man sollte annehmen, daß sich bei dem jungen Patienten die anfänglich gestörte Blutversorgung weitgehend normalisiert hat; ebenfalls läßt die Bruchform an eine Versprödung im Bereich der Cerclagen denken.

Auch bei der Druckplattenosteosynthese kommt es zur Ausbildung einer spitzen Kerbe am Plattenende, da sich die Platte hier bei Biegebeanspruchung in den Knochen einpreßt. Übermäßige Biegebeanspruchung kann dann zu den sogenannten Plattenendzonenbrüchen führen, einmal bedingt durch die Kerbwirkung, zum anderen durch eine

Spannungsversprödung infolge abrupter Kraftumleitung am Plattenende (LEITZ 60). Die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (A und O) empfiehlt daher das Aufbiegen der Plattenenden, um schädliche Kerben zu vermeiden; werden zwei Druckplatten verwendet, so sollen sie daher versetzt am Knochen angebracht werden.

Es können aber auch Strukturunterschiede im Knochen selbst, wie z.B. eine Knochennarbe eine Gewebsversprödung am Übergang zum normalen Knochen bewirken, wie wir in unserem Krankengut in zwei Fällen feststellen konnten; einer dieser Fälle sei hier als Beispiel angeführt:

Patient K.M., 26 J.: Patient zog sich eine Unterschenkel-schrägfraktur im mittleren Drittel zu, die auswärts konservativ behandelt wurde und zu knöcherner Konsolidierung führte. Nach 2 Jahren stürzte der Patient beim Fußballspiel und zog sich eine Refraktur zu. Die Tibia brach fingerbreit unterhalb der ehemaligen Frakturzone, während die Fibula diesmal im proximalen Drittel brach.

Offensichtlich hatte im vorliegenden Fall die Frakturstelle gegenüber der Umgebung eine erhöhte Belastbarkeit erlangt. Denkbar wäre das durch eine Corticalisverdickung und daraus resultierender Querschnittsvergrößerung oder auch durch vermehrte Kalkeinlagerung. Deshalb brach der Knochen nicht in der ehemaligen Bruchebene, sondern an der Grenze zum gesunden Knochen (Grenzzonebruch).

Auf die Möglichkeit dieser Sekundärfrakturen hatte auch schon BÜTTNER (20) hingewiesen, als er bemerkte, daß der kindliche Knochen durch die Frakturheilung auf lange

Zeit offenbar seine "eigentümliche elastische Beschaffenheit verliert und dem spröden Knochen des Erwachsenen viel näher steht."

In einem Fall beobachteten wir einen Versprödungsbruch nach Marknagelung:

Patient W.K., 17 J.: Durch Verkehrsunfall Ober- und Unterschenkelfraktur, beide im mittleren Drittel. Nach anfänglich konservativer Behandlung Marknagelung beider Brüche. Nach 6 Monaten Refraktur des Unterschenkels als der Patient auf das verletzte Bein fiel. Das Röntgenbild zeigte den genagelten Unterschenkelbruch und eine drei querfingerbreit darüberliegende Sekundärfraktur.

Auch in diesem Fall war der ursprüngliche Frakturspalt stärker belastbar als der darüber liegende Knochenabschnitt. Klassische Versprödungsbrüche nach Marknagelung, bei denen der Knochen am Ende des Marknagels bricht, in Analogie zu den Plattenendzonenbrüchen, wird es wohl kaum geben, weil die durch den Marknagel übertragenen Spannungen gleichmäßig durch die Spongiosa aufgenommen werden können, so daß es hierbei kaum zu gefährlichen Spannungsspitzen kommt. Zum anderen ist der Marknagel nicht in der Lage, eine zu Beginn der Frakturheilung durch seinen festen Sitz vielleicht auftretende Spannungsversprödung aufrecht zu erhalten, da er sich im Laufe der Frakturheilung durch Aufblätterung der inneren Compactaschichten infolge Druckatrophie lockert (UEHLINGER und PULS 101).

Wird eine Frakturfixation gleich durch eine elastische Verklemmung vorgenommen, wie z.B. durch den Rush-pin oder die Bündelnagelung nach Hackethal, so kann es schon

gar nicht zu einer gefährlichen Spannungsversprödung kommen.

Die Verhinderung dieser Sekundärfrakturen muß darauf zielen, die Möglichkeiten der konservativen Behandlung weitestgehend auszuschöpfen, zum anderen solche Osteosyntheseverfahren zu bevorzugen, die kaum Versprödungen verursachen und zum dritten das Osteosynthesematerial sobald wie möglich wieder zu entfernen.

5.5 Der Dystrophiebruch

Die Dystrophierefraktur ist bedingt durch eine ungenügende Ernährung des Knochens.

Zweifelsohne ist eine ungestörte Ernährung die wichtigste Voraussetzung für eine einwandfreie Konsolidierung der Fraktur und die Festigkeit des Knochens.

Grundlegende tierexperimentelle Arbeiten von ANDERSON (5), GÜTHMAN (31), RHINELANDER (80) und TRUETA (99) haben bewiesen, daß die Blutversorgung der Corticalis zu 2/3 von den Markgefäßen aus erfolgt und nur das äußere Drittel von den periostalen Blutgefäßen versorgt wird.

Bei der Marknagelung mit Aufweitung der Markhöhle werden die endostalen Blutgefäße weitgehend geschädigt, bei der Druckplattenosteosynthese die periostalen. Auch bei der konservativen Einrichtung eines Bruches können grobe Repositionsmanöver zu erheblicher Schädigung der periostalen Blutgefäße führen. Daß wir klinisch trotzdem keine nennenswerte Beeinträchtigung der Frakturheilung sehen, liegt daran, daß genügend Anastomosen zwischen den beiden Versorgungssystemen bestehen.

Durch eine bakterielle Entzündung muß auch mit einer Beeinträchtigung der Frakturheilung gerechnet werden. In unserem Krankengut beobachteten wir nach zwei Druckplattenosteosynthesen Infektionen, die zu Refrakturen führten; bei dieser Osteosynthesemethode ist die Gefahr einer Infektion erheblich größer als bei der Marknagelung, da der Frakturbereich weit eröffnet werden muß, während bei der gedeckten Marknagelung nur ein kleiner Einschnitt nötig ist, um den Nagel eintreiben zu können.

Die Verhütung dieser Sekundärfrakturen besteht einmal darin, bei der konservativen Behandlung grobe Repositionsmanöver zu vermeiden. Bei der operativen Behandlung sollte man schonend vorgehen und bei einem etwaigen nochmaligen Eingriff das primär durchgeführte Osteosyntheseverfahren erneut anwenden.

5.6 Schlußfolgerungen

Die konservative Behandlung weist mit 2,94 % neben der Marknagelung mit 2,26 % eine relativ geringe Refrakthäufigkeit im Vergleich zur Druckplattenosteosynthese mit 8,84 % und der Drahtcerclage mit 4 Refrakturen bei 15 Patienten auf.

Hauptsächlich sehen wir nach konservativer Behandlung Refrakturen durch zu frühe Belastung - hier vor allem bei Kindern und Jugendlichen - und durch gestörte Ernährung und damit verbundener ungenügender Kallusbildung. Im Hinblick auf die Refrakthäufigkeit ist somit die klassische Frakturheilung durch Kallusbildung der primären Knochenbruchheilung sicher nicht unterlegen. Mag der Fixationskallus von der Qualität her der primär angiogenen Knochenbildung unterlegen sein, so wird das

durch die Quantität weitgehend kompensiert, denn durch die damit verbundene Querschnittsvergrößerung wird die Belastbarkeit erhöht. Mit zunehmender Durchstrukturierung und Verfestigung des Bruchspaltes geht ein Abbau des überflüssig werdenden Kallus Hand in Hand (KUNER und WELLER 58); es herrscht somit immer Übereinstimmung zwischen Beanspruchung und Belastbarkeit des neugebildeten Knochengewebes.

Bei der Marknagelung ist die Kallusspindel ebenfalls als Positivum zu werten; aber auch bei primärer Knochenbruchheilung ist mit einer belastungsorientierten Anordnung des neugebildeten Lamellenknochens zu rechnen. Wir beobachten im bearbeiteten Zeitraum 8 Sekundärfrakturen nach Marknagelung, die sich gleichmäßig auf alle Gruppen verteilen. Eine signifikante Häufigkeit in einer Gruppe, die auf die Schwäche der Methode zurückzuführen wäre, ist nicht festzustellen.

Bei der Druckplattenosteosynthese sehen wir besonders viele Sekundärfrakturen durch Plattenbruch und funktionelle Anpassung des Knochens an das Osteosynthesematerial. Die Starrheit der Platte in Verbindung mit der festen Verankerung der Schrauben im Knochen ist wohl ein Grund für diese Refrakturen. Hinzu kommt noch eine Versprödung des Knochens im Bereich der Platte. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß bei dieser Osteosynthesemethode die Sekundärfrakturhäufigkeit rund 4 mal höher als bei der Marknagelung ist.

Die Druckterclage ist im Laufe der Zeit von anderen Osteosynthesemethoden abgelöst worden und deshalb heute kaum noch von Interesse. Die Ursache der relativ vielen Sekundärfrakturen nach dieser Methode ist neben einer

ungenügenden Stabilisierung der Frakturzone in einer Versprödung des Knochens und einer Schädigung der Blutgefäße zu suchen.

Auch der Rush-pin findet heute immer weniger Anwendung, da mit ihm durch seine Biegsamkeit nur eine federnde Fixation zu erreichen ist und diese Methode mit einer hohen Pseudarthroserate behaftet ist. Refrakturen sind selten und stellen die Ausnahme dar, da hier weder eine Versprödung noch eine funktionelle Anpassung des Knochens an das Osteosynthesematerial stattfindet.

c. Z U S A M M E N F A S S U N G

1. Die Refraktur langer Röhrenknochen war früher Thema weniger, aber ausführlicher Arbeiten, während sie heute im traumateologischen Schrifttum kaum Beachtung findet.
2. Anhand des Krankengutes der Chirurgischen Universitätsklinik Marburg/Lahn werden alle Schaftfrakturen der langen Röhrenknochen der Jahre 1961 - 1970 erfaßt. Die Ursache der in diesem Zeitraum aufgetretenen Refrakturen wird näher ergründet; dabei zeigt sich, daß sie auf wenige Faktoren zurückzuführen sind, wie zu frühe Belastung, Ermüdung, funktionelle Anpassung des Knochens an das Metallimplantat, Versprödung und gestörte lokale Ernährung.
3. Da die alte Einteilung der Refrakturen die biomechanischen Probleme, die erst aufgrund moderner Osteosyntheseverfahren aufgetreten sind, unberücksichtigt läßt, wird eine neue Einteilung der Refrakturen vorgenommen:
 - a) Kallusbruch, hervorgerufen durch plateartige Überbelastung eines störungsfrei unter Kallusbildung heilenden Knochens,
 - b) Ermüdungsbruch, hervorgerufen durch mehr oder weniger chronische Überbelastung,
 - c) Neutralisationsbruch, hervorgerufen durch funktionelle Anpassung des Knochens an das Osteosynthesematerial,
 - d) Versprödungsbruch, hervorgerufen durch Veränderungen des Spannungszustandes des Knochens,
 - e) Dystrophiebruch, hervorgerufen durch gestörte Ernährung.

4. Bei Auswertung des Krankengutes ergibt sich, daß die konservative Behandlung mit 2,94 % neben der Marknagelung mit 2,26 % eine relativ geringe Refrakthäufigkeit im Vergleich zur Druckplattenosteosynthese mit 8,84 % und der Drahtcerclage mit 4 Refrakturen bei 15 Patienten aufweist.

Refrakturen nach konservativer Behandlung werden als häufig durch zu frühe Belastung - hier vor allem bei Kindern und Jugendlichen - und durch gestörte Ernährung des Knochens.

Bei der Marknagelung ergibt sich keine signifikante Häufigkeit in einer Gruppe, die auf die Nachteile der Methode zurückzuführen wäre.

Bei der Druckplattenosteosynthese beobachten wir besonders viele Sekundärfrakturen durch Bruch der Implantate und funktionelle Anpassung des Knochens an das Osteosynthesematerial. Im Vergleich zur Marknagelung ist hier die Refrakthäufigkeit rund 4 mal höher.

Die Refrakturen nach Drahtcerclage wurden ausgelöst durch Überdehnung des Knochens und eine Verletzung der Blutgefäße.

5. Auf die Verhütung der einzelnen Sekundärfrakturen wird im Diskussionsteil jeweils kurz eingegangen.

L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S

1. ALLGÖWER, M.:
Osteosynthese und primäre Knochenbruch-
heilung.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 308, 425
(1964)
2. ALLGÖWER, M.:
Funktionelle Anpassung des Knochens
auf physiologische und unphysiologische
Beanspruchung.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 319, 383
(1967)
3. ALLGÖWER, M.; M.E.MÜLLER, R.SCHENK, H.WILLENEGGER:
Biomechanische Prinzipien bei der Me-
tallverwendung am Knochen.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 305, 1
(1963)
4. ALLGÖWER, M.:
Verschraubung von Tibiafrakturen.
Helv. Chir. Acta 1/2, 214 (1961)
5. ANDERSON, L.: Compression Plate Fixation and the
Effect of Different Types of Internal
Fixation on Fracture Healing.
J. Bone Joint Surg. 47-A, 191 (1965)
6. ARNESEN, A.J.A.:
Encircling Suture in Oblique Fractures.
Acta Chir. Scand. 102, 267 (1952)
7. ASAL :
Oberbelastungsschäden am Knochensystem
bei Soldaten.
Arch. klin. Chir. 186, 511 (1936)
8. BASSETT, C.A.L.:
Nature (Lond.) 190, 460 (1961)
9. BEDACHT, R.:
Knochenbruchbehandlung und Knochenbruch-
heilung.
Fortschr. d. Med. 10, 407 (1971)

10. BLOCH, H.F.:
Die Druckplattenosteosynthese der Vorderarmchaftfrakturen.
Helv. chir. Acta 30, 98 (1963)
11. BÖHLER, L.:
Unterschenkelchaftbrüche.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 276, 192 (1953)
12. BÖHLER, L.:
Unzweckmäßige und gefährliche Methoden bei der Behandlung von Frakturen.
Östsch. Ztschr. Chir. 235, 231 (1960)
13. BRAY, E.A., V. JEFFERSON :
Fractures of the Femoral Shaft.
A clinical Comparison of Treatment by Traction Suspension and Intramedullary Nailing.
Am. J. Surg. 34, 16 (1952)
14. BREMER, E.:
Über Refrakturen bei Vorderarmbrüchen Jugendlicher.
Zbl. Chir. 12, 1069 (1938)
15. BRUNNEN, F., M.E. WÜLLER :
Metallbeschaffenheit und Korrosionserscheinungen an Platten und Schrauben.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 305, 18 (1963)
16. BRYCE DE LA CAMP, H.:
Wandlungen und Fortschritte in der Lehre von Knochenbrüchen.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 276, 163 (1953)
17. BRYCE DE LA CAMP, H.:
Über das Verhalten der Knochenhaut beim Bruch des Humerusknochens.
Östsch. Ztschr. Chir. 205, 204, 391 (1927)
18. BRYCE DE LA CAMP, H.:
Die einfachste Frakturbehandlung einschließlich Extension.
Östsch. Ztschr. Chir. 235, 271 (1960)

14. SORREL DE LA CAMP, H.:
Fehler und Gefahren bei der operativen
Behandlung frischer Frakturen.
Dtsch. Zschr. Chir. 298, 87 (1961)
15. SOTTNER, A.:
Über Refrakturen im Kindesalter.
Chir. 19, 347 (1948)
16. BURWELL, N., A.D. CHARNLEY :
Treatment of Forearm Fractures in Adult
with Particular Reference to Plate
Fixation.
J. Bone Joint Surg. 46-B, 404 (1964)
17. CONTZEN, A.:
Frakturheilungsstörungen durch unzurei-
chende biomechanische Bedingungen.
Bericht über die unfallmedizinische
Tagung in Mainz 1960.
18. ZENCKER, H.:
Refracture of the Shaft of the Femur.
Acta orthop. Scand. 35, 16 (1964)
19. ROGERS, G.W.N.:
Internal Contact Splint.
J. Bone Joint Surg. 30-A, 40 (1948)
20. EHALT, W.:
Verletzungen bei Kindern und Jugend-
lichen.
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 1961
21. FASEL, A.:
Wiederholte Oberschenkelbrüche bei einem
Jugendlichen und Unfallbegutachtung.
Msch. Unfallheilk. 63, 270 (1960)
22. FISCHER-WASELS, J., H.B. SCHÖNEMANN:
Zur Frage der Marknagelfrakturen.
Arch. orthop. Unfall-Chir. 46, 207
(1953)
23. FRINTA, J.:
Refrakturen im Kindesalter.
Zbl. Chir. 82, 1241 (1957)

29. GEISER, M.:
Beiträge zur Biologie der Knochenbruch-
heilung.
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 1963
30. GEISER, M.:
"Soudure autogène" und Per-primam-
Heilung bei stabil fixierten Schaft-
frakturen?
Helv. chir. Acta 28, 499 (1961)
31. GÖTHMAN, L.:
Vascular Reactions in Experimental Frac-
tures.
Micoangiographic and Radioisotope
Studies.
Acta Chir. Scand. Supp. 284 (1961)
32. GRIESSMANN, H., W. SCHÜTTMEYER :
Weitere Erfahrungen mit der Marknagelung
nach Küntscher an der Chir. Universi-
tätsklinik Kiel.
Chirurg 17/18, 316 (1947)
33. GRIESSMANN, H., H. REICH :
Vergleichende Untersuchungen über den
Ablauf der Knochenbruchheilung bei der
Marknagelung und bei den mit Gipsver-
band behandelten Frakturen.
Arch. klin. Chir. 205, 455 (1943)
34. GROH, P.:
Die Behandlung von Frakturen langer
Röhrenknochen mit der AO-Osteosynthese-
methode und ihre Ergebnisse.
Inaug. Diss. Univ. Saarland (1968)
35. HAASE, W., G. RICHTER :
Knochenbrüche, beurteilt nach Grund-
sätzen und Erkenntnissen der techni-
schen Mechanik.
Arch. orthop. Unfall-Chir. 36, 541
(1936)
36. HAASE, W.:
Technisch-physikalische Untersuchungen
an Knochenbrüchen.
Bruns Beitr. klin. Chir. 164, 243 (1936)

37. HAASE, W.:
Schubebenen und Zerrüttungszonen beim Knochenbruch.
Arch. orthop. Unfall-Chir. 57, 592 (1957)
38. KELLER, C.:
Die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Osteosynthesemethoden bei frischen geschlossenen Brüchen.
Chirurg 10, 433 (1951)
39. HASLER, C., O. REISS :
Experimentelle Untersuchungen über die Festigkeit des Knochens im normalen und im Zustand der Bruchheilung.
Dtsch. Zschr. Chir. 240, 486 (1930)
40. HARTMANN, E. R.:
The Problem of Refracture in Fractures of the Femoral Shaft.
J. Bone Joint Surg. 36-A, 1071 (1954)
41. JONES, L.:
Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung mechanischen Druckes auf den Knochen.
Beiträge zur patholog. Anatomie und allgem. Pathologie 66 (1920)
42. KAPEL, O.:
Ober Refractura Antebrachii.
Chirurg 9, 932 (1937)
43. KEIL, W.:
Refraktur eines kindlichen Oberschenkels nach Drahtumschlingung.
Zbl. Chir. 41, 1038 (1958)
44. KNESE, K. H., D. VOGES, J. RITSCHL :
Untersuchungen über die Osteon- und Lamellenformen im Extremitätenskelett des Erwachsenen.
Zschr. f. Zellforsch. 40, 323 (1954)
45. KOSLER, H., E. WIECHELL :
Trajektorienverlauf bei der Druckplattenosteosynthese und seine biomechanische Auswirkung.
Chirurg 42, 80 (1971)

46. KOBLER, H.:
Knochenbildung und Knochenheilung.
Knochenbildung und Knochenheilung
im Zusammenhang mit der Knochen-
durch empfindliche Knochenheilung und nach
Marknagelung durch Kallus komprimierter
Bruchheilung.
Bruch. Beitr. Klin. Chir. 213, 71 (1937).
47. KOBLER, H., A. SCHMIDT:
Important Biomechanical Aspects of
Modern Methods of Osteosynthesis.
(in Druck)
48. KOBLER, H., A. SCHMIDT:
Die Kontraktur von Gelenkflächen.
Machz. f. Unfallheilk. 7, 302 (1932).
49. KOEHL, F.:
Über "Knochenheilung" als Ursache von
Spätfolgen bei Knochenbrüchen.
Zbl. Chir. 24, 1147 (1934).
50. KROMPACH, S.:
Die Knochenheilung.
Fischer, Jena 1937
51. KONTOWER, G.:
Das Kallusproblem.
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 1930
52. KONTOWER, G.:
Fraktur der Marknagelung.
Schattauer Verlag, Stuttgart 1941
53. KONTOWER, G.:
Das Kallusmodell.
Zbl. Chir. 40, 1633 (1937).
54. KONTOWER, G.:
Die biologischen Gesetze der Knochen-
heilung I und II.
Chirurg 2, 261 (1944).
55. KONTOWER, G.:
Viel oder wenig Kallus.
Machz. f. Unfallheilk. 34, 121 (1939).

56. KÖNTSCHER, G.:
Dauerbruch und Umbauzone.
Bruns Beitr. klin. Chir. 169, 557
(1959)
57. KÖNTSCHER, G.:
Zur Frage der Implantatentfernung.
Chirurg 42, 85 (1971)
58. KUNER, E., S. WELLER :
Zur Frage der Metallentfernung nach
Osteosynthesen.
Dtsch. med. Wschr. 93, 108 (1968)
59. LAM, S.J.:
The Place of Delayed Internal Fixation
in the Treatment of Fractures of the
Long Bones.
J. Bone Joint Surg. 46-B, 393 (1964)
60. LEITZ, G.:
Typische Komplikationen nach Osteosyn-
thesen und ihre biomechanischen Ursa-
chen.
Arch. orthop. Unfall-Chir. 64, 285
(1968)
61. LEITZ, G.:
Ursachen des Bruchverhaltens langer
Röhrenknochen. Untersucht am Beispiel
der menschlichen Fibula.
Ferd. Enke Verlag, Stuttgart 1970
62. LEITZ, G.:
Mechanische Konsequenzen der Kortikali-
spanentnahme.
Zschr. Orthop. 105, 484 (1968)
63. LEMPert, H., H. GURN :
Ergebnisse der Marknagelung nach Künt-
scher (111 Nagelungen in 35 Kranken-
häusern).
Arch. orthop. Unfall-Chir. 45, 145
(1952)
64. LEMPert, H.:
100 Marknagelungen in 27 Krankenhäusern.
Hefte z. Unfallheilk. 40, 24 (1951)

65. MATZEN, P.F.: Vom Einfluß mechanischer Einwirkungen auf die Kallusbildung.
Beitr. z. klin. Chir. 122, 97 (1924).
66. MATZEN, P.F.: Zur Histologie der Kallusbildung unter wechselnden mechanischen Bedingungen.
Zbl. Chir. 50, 2120 (1923).
67. MITTELBACH, H.F., A. BUCHMANN :
Vorderarmchirurgie. Prinzipien, Techniken und Ergebnisse einer allgemeinen-chirurgischen Klinik.
Chirurg 7, 306 (1927).
68. MÜLLER, M.E.: Zur Frage der primären Frakturheilung nach Osteosynthese.
Dtsch. med. Wochschr. 35, 2396 (1909).
69. MÜLLER, M.E.; M. ALLSOWER, H. WILLENROCKER :
Manual of Internal Fixation.
Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1970.
70. NEFF, G.: Diskussionsbeitrag.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 302, 433 (1964).
71. OLSSON, O.: Some Cases of Necrosis of the Bone by Encircling Suture (Cerclage), in Oblique Fractures.
Acta Chir. Scand. 95, 83 (1946).
72. OSTERLAND :
Spontanfrakturen bei Soldaten nach Reichsheerbeobachtungen.
Arch. klin. Chir. 179, 567 (1934).
73. PELZL, H.: Nachbehandlungen nach Osteosynthesen.
Fortschr. Med. 17, 711 (1971).
74. PEPITZ, F.: Kezidiirfrakturen am Vorderarm.
Zbl. Chir. 34, 3242 (1927).

78. PETROKOV, V.:
Die Biomechanik der Kallusbildung und
experimentelle Bewertung der Druck-
osteosynthese.
Bruns Beitr. klin. Chir. 205, 265
79. PUTSCHER, G.W.:
Allgemeine Morphologie und Dynamik des
Knochenumbaus unter normalen und patho-
logischen Bedingungen.
Verh. dtsh. Ges. Path. 47. Tagg. 113
(1963)
77. RAY, R., B. SANKARAN, K. FETROW :
Delayed Union and Nonunion of Fractures.
J. Bone Joint Surg. 46-A, 627 (1964)
78. REHM, J., D. UESINGER:
Die Behandlung von Frakturen langer
Schenkelknochen mit dem Marknagel nach
Küntscher.
Arch. Orthop. Unfall-Chir. 55, 82
(1963)
79. SCHUB, P.:
Die Infektion und Regeneration des
frischen Knochenbruchs unter besonde-
rer Berücksichtigung der Marknagelung
nach Küntscher.
Zschr. Orthop. 77, 1 (1948)
80. RHINELANDER, F.W., R.A. BARAGRY :
Microangiography in Bone Healing.
J. Bone Joint Surg. 44-A, 1273 (1962)
81. RISCHANY, S.F., H. SPRINZ, K. KRANER, J. ASBY, T. MERRILL :
The Role of the Diaphysial Medulla in
the Repair and Regeneration of the
Femoral Shaft in the Adult Cat.
J. Bone Joint Surg. 47-A, 1565 (1965)
82. RICHON, A., J.J. LIVIO, F. SAEGESSER :
Les refractures après osteosynthèse par
plaque à compression.
Helv. chir. Acta 34, 49 (1967)
83. RINIKER, P.:
Pathologie der Frakturheilung.
Zschr. Unfallmed. Berufskrh. 57, 211
(1964)

24. KORMER, C.:
Über den Ablauf der Regenerationsvorgänge am Röhrenknochen bei erhaltener und geschädigter Gefäßversorgung.
Arch. Chir. 123, 531 (1927).
25. SARCENT, J.P., W.A. TLIPNER :
Treatment of Forearm Shaft Fractures by Double-Plating.
J. Bone Joint Surg. 47-A, 1475 (1965).
26. LAMPE, H.:
Rezidivbrüche und Refrakturen.
Arch. klin. Chir. 261, 435 (1941).
27. SCHIFFERT, K.E., C. TROJAN :
Zur Behandlung der offenen Unterschenkelbrüche.
Bruns Beitr. klin. Chir. 267, 187 (1962).
28. SCHENK, R., H. WILLENBOGER :
Zum histologischen Bild der sogenannten Primärheilung der Knochenkompakta nach experimentellen Osteotomien am Hund.
Experientia (Basel) 19/10, 593 (1963).
29. SCHENK, R., H. WILLENBOGER :
Zur Histologie der primären Knochenheilung.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 308, 440 (1964).
30. SCHMIDT, V.:
Traumatologie.
Thieme Verlag, Stuttgart 1968.
31. SCHMIDT, V.:
Zu den Problemen der Osteosynthese, der Knochenneubildung und der Knochenverpflanzung.
Chirurg 31, 226 (1966).
32. SCHMIDT, G., M. ALBOWITZ :
Realität und Relativität der primären Knochenheilung.
Chirurg 36, 504 (1968).

93. SEGMÖLLER, G., E. CORRODI, G. KESSLER :
Ergebnisse der Tibiaosteosynthese:
Untersuchungen an drei geschlossenen
Serien von insgesamt 462 Fällen.
Zschr. Unfallmed. Berufskrh. 57, 252
(1964)
94. STRAUMANN, F., S. STEINMANN, O. POTTLER, H. WILLENFEGGER,
R. SCHENK :
Neue experimentelle und klinische Ergeb-
nisse über die Metallose.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 305, 2
(1963)
95. STEINHAUSER, J. :
Zur Ätiologie von Ermüdungsbrüchen nach
Platten- bzw. Schrauben-Osteosynthesen.
Verh. dtsh. Ges. Orthop. 54, 387
(1968)
96. SEYFFARTH, G. :
Die Refraktur am kindlichen Vorderarm.
Msch. Unfallheilk. 50, 525 (1966)
97. STRAUSS, L., F. MANDEL :
Über Rezidivfrakturen.
Dtsch. Zschr. Chir. 238, 281 (1955)
98. TROELL, A. :
Zur Kenntnis von Refrakturen.
Arch. klin. Chir. 109, 576 (1918)
99. TRUEITA, J., A. X. CAVADIAS :
Vascular Changes Caused by the Küntscher
Type of Nailing. An Experimental Study
in the Rabbit.
J. Bone Joint Surg. 37-B, 492 (1955)
100. TSCHERNE, H., F. MAGERL, P. FLEISCHL :
Die Marknagelung frischer offener und
geschlossener Unterschenkelfrakturen.
Langenbecks Arch. Chir. 317, 209
(1967)
101. UHLINGER, E., P. PULS :
Funktionelle Anpassung des Knochens auf
physiologische und unphysiologische
Beanspruchung.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 319, 362
(1967)

102. VIERNSTEIN, K., K.H. TROGER :
Konservative oder operative Behandlung
der frischen Interoschenkelfrakturen?
MMW 44, 2159 (1967)
103. WACHSMUTH, W.: Zur Ätiologie von schleichenden Frak-
turen.
Chirurg 9, 16 (1977)
104. WÄGNER, H.:
Die Einsetzung von Metallschrauben in
Knochen und die Heilungsvorgänge des
Knochenwachstums unter dem Einfluß der
stabilen Osteosynthese.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 306, 28
(1967)
105. WÄGNER, C.:
Die primäre Knochenbruchheilung und
ihre Störung im Röntgenbild.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 312, 474
(1964)
106. WILLIAMSCHÄFER, H.:
Fragen der operativen Frakturenbehandlung.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 276, 177
(1963)
107. WILLIAMSCHÄFER, H., G.M. PRZESN, R. SCHANK :
Primäre und sekundäre Knochenbruchheilung.
Chirurg 6, 241 (1971)
108. WILLIAMSCHÄFER, H., R. SCHANK, F. STRAUMANN, M. MÜLLER,
M. ALBACHNER, H. KROGER:
Methodik und vorläufige Ergebnisse ex-
perimenteller Untersuchungen über die
Heilungsvorgänge bei stabiler Osteosynthese
an Gabelfrakturen.
Langenbecks Arch. klin. Chir. 301, 346
(1962)
109. ZORN, E., MONZNER-SCHÄFER, K.J., KROGER, H. :
Über Komplikationen und Fehler bei der
Verwendung des Instrumentariums der
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese.
Z. Orthop. 106, 264 (1969)

Am Schluß möchte ich Herrn Dr.med. H. Köbler für die Überlassung des Themas sowie für die Unterstützung bei der Ausführung der Arbeit meinen herzlichen Dank aussprechen.

Herrn Prof. Dr. med. K. Hupe danke ich für die Übernahme des Referates und Herrn Prof. Dr. med. dent. H. Schnell für die Übernahme des Correferates.

LEBENS LAUF

Am 22. August 1941 wurde ich als Sohn des Bankkaufmanns Kurt Döhlgers und seiner Ehefrau Antje, geb. Doentz in Glatz geboren.

Von 1952 bis 1956 besuchte ich die Grundschule in Hannover und wechselte dann zur Mittelschule über, die ich Ostern 1962 mit der Mittleren Reife verließ. Anschließend begann ich eine $3\frac{1}{2}$ jährige Lehre als Fernmeldemonteur, die im Herbst 1965 beendet war. Ab Oktober 1966 besuchte ich das Abendgymnasium in Hannover, um auf den zweiten Bildungsweg des Abitur zurückzukehren. Am 26.2.1968 bestand ich die Reifeprüfung und begann im Sommersemester 1968 das Studium der Zahnheilkunde in Marburg. Vorphysikum im Frühjahr 1969 und zahnärztliche Vorprüfung im Herbst 1970.

Meine akademischen Lehrer in Marburg waren die
Herren Professoren

Goebell, Haan, Hennis, Hering, Heuser, Janke,
Keil, Korb, Pantke, Petry, Riecken, Rohen,
Rosemann, Rupec, Schiff, Schmitt-Moormann,
Seidel, Schmidt, Schnell.

